

Orientações de Adaptação

Orientações Gerais Reprodutores Genetiporc

- Após a recepção o cliente deve assinar uma declaração onde consta que recebeu os animais em perfeitas condições físicas, ou então fazer as observações que forem necessárias.
- Preferencialmente a granja que recebe os reprodutores deve ter um quarentenário, o qual deve estar localizado no mínimo a 300 metros de distância das demais instalações.
- Quando o quarentenário não estiver disponível, deve-se isolar, higienizar e desinfetar parte das instalações existentes para o alojamento dos animais.

- Fornecer ração medicada durante 30 dias, conforme o esquema abaixo (programa 10-7-10-7-10), ou de acordo com orientações do médico veterinário responsável pela granja.

10 dias	Com medicação
7 dias	Sem medicação
10 dias	Com medicação
7 dias	Sem medicação
10 dias	Com medicação

- Aplicar duas doses da vacina tríplice para Parvovirose / Leptospirose / Erisipela antes da cobertura de acordo com a recomendação do fabricante.
- Também podem ser aplicadas as vacinas de uso rotineiro da granja receptora como Micoplasma, H.parasuis e Pasteurela.

Orientações Específicas Machos Genetiporc



- Os machos devem ser alojados individualmente em baias de 6 a 7 m².
- Fornecer ração de crescimento a partir do alojamento na quantia de 2,5 kg/dia.
- Iniciar os treinamentos com manequim no mínimo três semanas após o alojamento ou quando atingirem 180 dias de idade.
- Iniciar a monta natural com 240 dias de idade.

Orientações Específicas Fêmeas Genetiporc

- As fêmeas devem ser alojadas em grupos pequenos com mínimo de 1,2 m² por animal.
- Fornecer ração de reposição a vontade, a partir do alojamento.
- Duas semanas antes da cobertura, fornecer uma ração mais energética para estimular a ovulação (Flushing).
- Transferir as fêmeas para o setor de monta em grupos de acordo com o tamanho e sincronização do cio.
- Reagrupar as fêmeas em cio, formando novos grupos sincronizados de acordo com a capacidade das baias.
- As leitoas devem ser cobertas com 140kg – 150kg de peso quando atingem aproximadamente 230 a 240 dias de idade.



Seguir os seguintes critérios de cobertura:

- Peso mínimo de 140 Kg;
- Espessura de toucinho de 16-18 mm no P2;
- Idade entre 230-240 dias;
- Mínimo de três cios;
- Ótima imunidade;
- Bom estado corporal.